

OSLOMET

# Tallinjer, intervall og doble ulikheter

Nikolai Bjørnestøl Hansen

OSLO METROPOLITAN UNIVERSITY  
STORBYUNIVERSITETET



Foto: Ronny Østnes / OsloMet

# Tallinjer, intervall og doble ulikheter

## 1 Tallinjer, intervall og doble ulikheter


- Tallinja
- Doble ulikheter og intervall
- Åpne og lukkede intervall
- Halvåpne intervall og uendelige intervall
- Standard notasjon

## 2 Andregradsulikheter

## 3 Rasjonale ulikheter


# Tallinja

- Tallinja er en måte å se for seg tallene på.



# Tallinja


- Tallinja er en måte å se for seg tallene på.



- Avstanden mellom heltallene skal være uniform (lik overalt). Denne avstanden kalles skalaen til tallinjen.

# Tallinja


- Tallinja er en måte å se for seg tallene på.



- Avstanden mellom heltallene skal være uniform (lik overalt). Denne avstanden kalles **skalaen** til tallinjen.
- Alle reelle tall har sin plass på tallinjen.

# Tallinja


- Tallinja er en måte å se for seg tallene på.



- Avstanden mellom heltallene skal være **uniform** (lik overalt). Denne avstanden kalles **skalaen** til tallinjen.
- Alle reelle tall har sin plass på tallinjen.
- Tallinjen er uendelig lang, så vi tegner alltid bare en del av den.

# Tallinja

- Tallinja er en måte å se for seg tallene på.



- Avstanden mellom heltallene skal være **uniform** (lik overalt). Denne avstanden kalles **skalaen** til tallinjen.
- Alle reelle tall har sin plass på tallinjen.
- Tallinjen er uendelig lang, så vi tegner alltid bare en del av den.
- Det du tegner trenger ikke ha 0 i midten.

# Tallinjer, intervall og doble ulikheter

## 1 Tallinjer, intervall og doble ulikheter

- Tallinja
- Doble ulikheter og intervall
- Åpne og lukkede intervall
- Halvåpne intervall og uendelige intervall
- Standard notasjon

## 2 Andregradsulikheter

## 3 Rasjonale ulikheter

# Doble ulikheter

- Hvis vi vil si « $x$  er større enn 3» kan vi skrive « $x > 3$ ».

# Doble ulikheter

- Hvis vi vil si « $x$  er større enn 3» kan vi skrive « $x > 3$ ».
- Men hva om vi vil si « $x$  er mellom 2 og 7»?

# Doble ulikheter

- Hvis vi vil si « $x$  er større enn 3» kan vi skrive « $x > 3$ ».
- Men hva om vi vil si « $x$  er mellom 2 og 7»?
- En måte å skrive det på er ved hjelp av **to** ulikeheter:

$$2 < x \quad \text{og} \quad x < 7.$$

# Doble ulikheter

- Hvis vi vil si « $x$  er større enn 3» kan vi skrive « $x > 3$ ».
- Men hva om vi vil si « $x$  er mellom 2 og 7»?
- En måte å skrive det på er ved hjelp av **to** ulikeheter:

$$2 < x \quad \text{og} \quad x < 7.$$

- Dette forenkler vi ved å skrive det som en **dobbelt ulikhet**,

$$2 < x < 7.$$

# Doble ulikheter

- Hvis vi vil si « $x$  er større enn 3» kan vi skrive « $x > 3$ ».
- Men hva om vi vil si « $x$  er mellom 2 og 7»?
- En måte å skrive det på er ved hjelp av **to** ulikeheter:

$$2 < x \quad \text{og} \quad x < 7.$$

- Dette forenkler vi ved å skrive det som en **dobbelt ulikhet**,

$$2 < x < 7.$$

- I doble ulikheter skriver vi det minste tallet først, så vi ville vanligvis ikke skrevet  $7 > x > 2$ .

# Doble ulikheter

- Hvis vi vil si « $x$  er større enn 3» kan vi skrive « $x > 3$ ».
- Men hva om vi vil si « $x$  er mellom 2 og 7»?
- En måte å skrive det på er ved hjelp av **to** ulikeheter:

$$2 < x \quad \text{og} \quad x < 7.$$

- Dette forenkler vi ved å skrive det som en **dobbelt ulikhet**,

$$2 < x < 7.$$

- I doble ulikheter skriver vi det minste tallet først, så vi ville vanligvis ikke skrevet  $7 > x > 2$ .
- Den siste skrivemåten er ikke feil, men det er mer naturlig å gå fra lavt til høyt.

# Å løse doble ulikheter

Dersom den ukjente er i **midten** av en dobbel ulikhet, kan vi løse begge ulikhetene samtidig.

# Å løse doble ulikheter

Dersom den ukjente er i **midten** av en dobbel ulikhet, kan vi løse begge ulikhetene samtidig.

## Eksempel

Vi skal løse  $-7 \leq 3 - 5x < 18$ . Vi får:

# Å løse doble ulikheter

Dersom den ukjente er i **midten** av en dobbel ulikhet, kan vi løse begge ulikhetene samtidig.

## Eksempel

Vi skal løse  $-7 \leq 3 - 5x < 18$ . Vi får:

$$-7 \leq 3 - 5x < 18$$

# Å løse doble ulikheter

Dersom den ukjente er i **midten** av en dobbel ulikhet, kan vi løse begge ulikhetene samtidig.

## Eksempel

Vi skal løse  $-7 \leq 3 - 5x < 18$ . Vi får:

$$-7 \leq 3 - 5x < 18$$

$$-7 - 3 \leq -5x < 18 - 3$$

# Å løse doble ulikheter

Dersom den ukjente er i **midten** av en dobbel ulikhet, kan vi løse begge ulikhetene samtidig.

## Eksempel

Vi skal løse  $-7 \leq 3 - 5x < 18$ . Vi får:

$$-7 \leq 3 - 5x < 18$$

$$-7 - 3 \leq -5x < 18 - 3$$

$$-10 \leq -5x < 15$$

# Å løse doble ulikheter

Dersom den ukjente er i **midten** av en dobbel ulikhet, kan vi løse begge ulikhettene samtidig.

## Eksempel

Vi skal løse  $-7 \leq 3 - 5x < 18$ . Vi får:

$$-7 \leq 3 - 5x < 18$$

$$-7 - 3 \leq -5x < 18 - 3$$

$$-10 \leq -5x < 15$$

$$\frac{-10}{-5} \geq x > \frac{15}{-5}$$

# Å løse doble ulikheter

Dersom den ukjente er i **midten** av en dobbel ulikhet, kan vi løse begge ulikhettene samtidig.

## Eksempel

Vi skal løse  $-7 \leq 3 - 5x < 18$ . Vi får:

$$-7 \leq 3 - 5x < 18$$

$$-7 - 3 \leq -5x < 18 - 3$$

$$-10 \leq -5x < 15$$

$$\frac{-10}{-5} \geq x > \frac{15}{-5}$$

$$2 \geq x > -3$$

# Å løse doble ulikheter

Dersom den ukjente er i **midten** av en dobbel ulikhet, kan vi løse begge ulikhettene samtidig.

## Eksempel

Vi skal løse  $-7 \leq 3 - 5x < 18$ . Vi får:

$$-7 \leq 3 - 5x < 18$$

$$-7 - 3 \leq -5x < 18 - 3$$

$$-10 \leq -5x < 15$$

$$\frac{-10}{-5} \geq x > \frac{15}{-5}$$

$$2 \geq x > -3$$

$$-3 < x \leq 2$$

# Å løse doble ulikheter

Dersom den ukjente er i **midten** av en dobbel ulikhet, kan vi løse begge ulikhettene samtidig.

## Eksempel

Vi skal løse  $-7 \leq 3 - 5x < 18$ . Vi får:

$$-7 \leq 3 - 5x < 18$$

$$-7 - 3 \leq -5x < 18 - 3$$

$$-10 \leq -5x < 15$$

$$\frac{-10}{-5} \geq x > \frac{15}{-5}$$

$$2 \geq x > -3$$

$$-3 < x \leq 2$$

Vi foretrekker å skrive svaret som  $-3 < x \leq 2$  i stedet for  $2 \geq x > -3$ .

# Å løse doble uliketer II

Dersom den ukjente er andre steder enn i midten, må vi dele opp i to ulikheter.

## Eksempel

Vi skal løse  $x - 1 < 3x + 5 < 2x + 9$ . Vi deler opp i:

# Å løse doble uliketer II

Dersom den ukjente er andre steder enn i midten, må vi dele opp i to ulikheter.

## Eksempel

Vi skal løse  $x - 1 < 3x + 5 < 2x + 9$ . Vi deler opp i:

$$x - 1 < 3x + 5$$

$$3x + 5 < 2x + 9$$

# Å løse doble uliketer II

Dersom den ukjente er andre steder enn i midten, må vi dele opp i to ulikheter.

## Eksempel

Vi skal løse  $x - 1 < 3x + 5 < 2x + 9$ . Vi deler opp i:

$$x - 1 < 3x + 5$$

$$-1 - 5 < 3x - x$$

$$3x + 5 < 2x + 9$$

# Å løse doble uliketer II

Dersom den ukjente er andre steder enn i midten, må vi dele opp i to ulikheter.

## Eksempel

Vi skal løse  $x - 1 < 3x + 5 < 2x + 9$ . Vi deler opp i:

$$x - 1 < 3x + 5$$

$$- 1 - 5 < 3x - x$$

$$- 6 < 2x$$

$$3x + 5 < 2x + 9$$

# Å løse doble uliketer II

Dersom den ukjente er andre steder enn i midten, må vi dele opp i to ulikheter.

## Eksempel

Vi skal løse  $x - 1 < 3x + 5 < 2x + 9$ . Vi deler opp i:

$$x - 1 < 3x + 5$$

$$-1 - 5 < 3x - x$$

$$-6 < 2x$$

$$-3 < x$$

$$3x + 5 < 2x + 9$$

# Å løse doble uliketer II

Dersom den ukjente er andre steder enn i midten, må vi dele opp i to ulikheter.

## Eksempel

Vi skal løse  $x - 1 < 3x + 5 < 2x + 9$ . Vi deler opp i:

$$x - 1 < 3x + 5$$

$$-1 - 5 < 3x - x$$

$$-6 < 2x$$

$$-3 < x$$

$$3x + 5 < 2x + 9$$

$$3x - 2x < 9 - 5$$

# Å løse doble uliketer II

Dersom den ukjente er andre steder enn i midten, må vi dele opp i to ulikheter.

## Eksempel

Vi skal løse  $x - 1 < 3x + 5 < 2x + 9$ . Vi deler opp i:

$$x - 1 < 3x + 5$$

$$-1 - 5 < 3x - x$$

$$-6 < 2x$$

$$-3 < x$$

$$3x + 5 < 2x + 9$$

$$3x - 2x < 9 - 5$$

# Å løse doble uliketer II

Dersom den ukjente er andre steder enn i midten, må vi dele opp i to ulikheter.

## Eksempel

Vi skal løse  $x - 1 < 3x + 5 < 2x + 9$ . Vi deler opp i:

$$x - 1 < 3x + 5$$

$$-1 - 5 < 3x - x$$

$$-6 < 2x$$

$$-3 < x$$

$$3x + 5 < 2x + 9$$

$$3x - 2x < 9 - 5$$

$$x < 4$$

# Å løse doble uliketer II

Dersom den ukjente er andre steder enn i midten, må vi dele opp i to ulikheter.

## Eksempel

Vi skal løse  $x - 1 < 3x + 5 < 2x + 9$ . Vi deler opp i:

$$x - 1 < 3x + 5$$

$$-1 - 5 < 3x - x$$

$$-6 < 2x$$

$$-3 < x$$

$$3x + 5 < 2x + 9$$

$$3x - 2x < 9 - 5$$

$$x < 4$$

Siden vi har  $-3 < x$  og  $x < 4$  kan vi slå sammen til

$$-3 < x < 4.$$

# Intervall

## Definisjon

Et intervall er en sammenhengende mengde tall på tallinjen.

# Intervall

## Definisjon

Et intervall er en sammenhengende mengde tall på tallinjen.

## Eksempler:

- Alle tall fra og med 2 til og med 3 er et intervall.

# Intervall

## Definisjon

Et intervall er en sammenhengende mengde tall på tallinjen.

## Eksempler:

- Alle tall fra og med 2 til og med 3 er et intervall.
- Alle tall større enn  $-2$  er et intervall.

# Intervall

## Definisjon

Et intervall er en sammenhengende mengde tall på tallinjen.

## Eksempler:

- Alle tall fra og med 2 til og med 3 er et intervall.
- Alle tall større enn  $-2$  er et intervall.
- Alle tall bortsett fra 0 er **ikke** et intervall.

# Intervall

## Definisjon

Et intervall er en sammenhengende mengde tall på tallinjen.

## Eksempler:

- Alle tall fra og med 2 til og med 3 er et intervall.
- Alle tall større enn  $-2$  er et intervall.
- Alle tall bortsett fra 0 er **ikke** et intervall.
- Tallene 1, 2 og 3 er **ikke** et intervall.

# Intervall

## Definisjon

Et intervall er en sammenhengende mengde tall på tallinjen.

## Eksempler:

- Alle tall fra og med 2 til og med 3 er et intervall.
- Alle tall større enn  $-2$  er et intervall.
- Alle tall bortsett fra 0 er **ikke** et intervall.
- Tallene 1, 2 og 3 er **ikke** et intervall.
- **Alle** tallene er et intervall.

# Intervall og ulikheter

- Alle intervall kan beskrives med en enkel eller dobbel ulikhet.

# Intervall og ulikheter

- Alle intervall kan beskrives med en enkel eller dobbel ulikhet.
- Alle tall fra og med 2 til og med 3 kan skrives som

*Alle  $x$  med  $2 \leq x \leq 3$ .*

# Intervall og ulikheter

- Alle intervall kan beskrives med en enkel eller dobbel ulikhet.
- Alle tall fra og med 2 til og med 3 kan skrives som

*Alle  $x$  med  $2 \leq x \leq 3$ .*

- Alle tall større enn  $-2$  kan skrives som

*Alle  $x$  med  $x > -2$ .*

# Intervall og ulikheter

- Alle intervall kan beskrives med en enkel eller dobbel ulikhet.
- Alle tall fra og med 2 til og med 3 kan skrives som

*Alle  $x$  med  $2 \leq x \leq 3$ .*

- Alle tall større enn  $-2$  kan skrives som

*Alle  $x$  med  $x > -2$ .*

- Hvis tar med  $\infty$ , kan vi alltid skrive det som en dobbel ulikhet.

# Intervall og ulikheter

- Alle intervall kan beskrives med en enkel eller dobbel ulikhet.
- Alle tall fra og med 2 til og med 3 kan skrives som

*Alle  $x$  med  $2 \leq x \leq 3$ .*

- Alle tall større enn  $-2$  kan skrives som

*Alle  $x$  med  $x > -2$ .*

- Hvis tar med  $\infty$ , kan vi alltid skrive det som en dobbel ulikhet.
- Alle tall større enn  $-2$  blir da

*Alle  $x$  med  $-2 < x < \infty$ .*

# Intervall og ulikheter

- Alle intervall kan beskrives med en enkel eller dobbel ulikhet.
- Alle tall fra og med 2 til og med 3 kan skrives som

*Alle  $x$  med  $2 \leq x \leq 3$ .*

- Alle tall større enn  $-2$  kan skrives som

*Alle  $x$  med  $x > -2$ .*

- Hvis tar med  $\infty$ , kan vi alltid skrive det som en dobbel ulikhet.
- Alle tall større enn  $-2$  blir da

*Alle  $x$  med  $-2 < x < \infty$ .*

- Alle tall kan skrives

*Alle  $x$  med  $-\infty < x < \infty$ .*

# Åpne, lukkede og halvåpne intervall

- Intervaller har **endepunkter**.

# Åpne, lukkede og halvåpne intervall

- Intervaller har **endepunkter**.
- Intervallet fra og med 2 til og med 3 har endepunktene 2 og 3.

# Åpne, lukkede og halvåpne intervall

- Intervaller har **endepunkter**.
- Intervallet fra og med 2 til og med 3 har endepunktene 2 og 3.
- Intervallet fra  $-2$  og opp har  $-2$  som endepunkt.

# Åpne, lukkede og halvåpne intervall

- Intervaller har **endepunkter**.
- Intervallet fra og med 2 til og med 3 har endepunktene 2 og 3.
- Intervallet fra  $-2$  og opp har  $-2$  som endepunkt.
- Intervallet som består av alle tall er det eneste intervallet som har **ingen** endepunkter.

# Åpne, lukkede og halvåpne intervall

- Intervaller har **endepunkter**.
- Intervallet fra og med 2 til og med 3 har endepunktene 2 og 3.
- Intervallet fra  $-2$  og opp har  $-2$  som endepunkt.
- Intervallet som består av alle tall er det eneste intervallet som har **ingen** endepunkter.

Vi gir intervaller forskjellige navn avhengig av om endepunktene er en del av intervallet. Et intervall kan være

# Åpne, lukkede og halvåpne intervall

- Intervaller har **endepunkter**.
- Intervallet fra og med 2 til og med 3 har endepunktene 2 og 3.
- Intervallet fra  $-2$  og opp har  $-2$  som endepunkt.
- Intervallet som består av alle tall er det eneste intervallet som har **ingen** endepunkter.

Vi gir intervaller forskjellige navn avhengig av om endepunktene er en del av intervallet. Et intervall kan være

**Åpent:** Dersom ingen av endepunktene er med.

# Åpne, lukkede og halvåpne intervall

- Intervaller har **endepunkter**.
- Intervallet fra og med 2 til og med 3 har endepunktene 2 og 3.
- Intervallet fra  $-2$  og opp har  $-2$  som endepunkt.
- Intervallet som består av alle tall er det eneste intervallet som har **ingen** endepunkter.

Vi gir intervaller forskjellige navn avhengig av om endepunktene er en del av intervallet. Et intervall kan være

**Åpent:** Dersom ingen av endepunktene er med.

**Lukket:** Dersom alle endepunktene er med.

# Åpne, lukkede og halvåpne intervall

- Intervaller har **endepunkter**.
- Intervallet fra og med 2 til og med 3 har endepunktene 2 og 3.
- Intervallet fra  $-2$  og opp har  $-2$  som endepunkt.
- Intervallet som består av alle tall er det eneste intervallet som har **ingen** endepunkter.

Vi gir intervaller forskjellige navn avhengig av om endepunktene er en del av intervallet. Et intervall kan være

**Åpent:** Dersom ingen av endepunktene er med.

**Lukket:** Dersom alle endepunktene er med.

**Halvåpent:** Dersom ett endepunkt er med og ett ikke er med.

# Tallinjer, intervall og doble ulikheter

## 1 Tallinjer, intervall og doble ulikheter

- Tallinja
- Doble ulikheter og intervall
- Åpne og lukkede intervall
- Halvåpne intervall og uendelige intervall
- Standard notasjon

## 2 Andregradsulikheter

## 3 Rasjonale ulikheter

# Åpne intervall

- I stedet for å hele tiden måtte skrive «Tallene mellom  $-1$  og  $3$ » så skriver vi

$$\langle -1, 3 \rangle.$$

# Åpne intervall

- I stedet for å hele tiden måtte skrive «Tallene mellom  $-1$  og  $3$ » så skriver vi  $\langle -1, 3 \rangle$ .
- Dette er alle tall som er større enn  $-1$  og mindre enn  $3$ . Tallene  $-1$  og  $3$  er ikke med.

# Åpne intervall

- I stedet for å hele tiden måtte skrive «Tallene mellom  $-1$  og  $3$ » så skriver vi
$$\langle -1, 3 \rangle.$$
- Dette er alle tall som er større enn  $-1$  og mindre enn  $3$ . Tallene  $-1$  og  $3$  er ikke med.
- Om  $x$  er et tall som er større enn  $-1$  og mindre enn  $3$  kan vi derfor enten skrive


$$-1 < x < 3 \quad \text{eller} \quad x \in \langle -1, 3 \rangle.$$

# Åpne intervall

- I stedet for å hele tiden måtte skrive «Tallene mellom  $-1$  og  $3$ » så skriver vi  $\langle -1, 3 \rangle$ .
- Dette er alle tall som er større enn  $-1$  og mindre enn  $3$ . Tallene  $-1$  og  $3$  er ikke med.
- Om  $x$  er et tall som er større enn  $-1$  og mindre enn  $3$  kan vi derfor enten skrive

$$-1 < x < 3 \quad \text{eller} \quad x \in \langle -1, 3 \rangle.$$

- Vi tegner åpne intervall på tallinja slik:



# Lukkede intervall

- I stedet for å hele tiden måtte skrive «Tallene fra og med  $-2$  til og med  $1$ » så skriver vi

$$[-2, 1].$$

# Lukkede intervall

- I stedet for å hele tiden måtte skrive «Tallene fra og med  $-2$  til og med  $1$ » så skriver vi
$$[-2, 1].$$
- Dette er alle tall som er større enn eller lik  $-2$  og mindre enn eller lik  $1$ . Tallene  $-2$  og  $1$  er med.

# Lukkede intervall

- I stedet for å hele tiden måtte skrive «Tallene fra og med  $-2$  til og med  $1$ » så skriver vi

$$[-2, 1].$$

- Dette er alle tall som er større enn eller lik  $-2$  **og** mindre enn eller lik  $1$ . Tallene  $-2$  og  $1$  **er** med.
- Om  $x$  er et tall som er større enn eller lik  $-2$  og mindre enn eller lik  $1$  kan vi derfor enten skrive

$$-2 \leq x \leq 1 \quad \text{eller} \quad x \in [-2, 1].$$

# Lukkede intervall


- I stedet for å hele tiden måtte skrive «Tallene fra og med  $-2$  til og med  $1$ » så skriver vi

$$[-2, 1].$$

- Dette er alle tall som er større enn eller lik  $-2$  og mindre enn eller lik  $1$ . Tallene  $-2$  og  $1$  er med.
- Om  $x$  er et tall som er større enn eller lik  $-2$  og mindre enn eller lik  $1$  kan vi derfor enten skrive

$$-2 \leq x \leq 1 \quad \text{eller} \quad x \in [-2, 1].$$

- Vi tegner lukkede intervall på tallinja slik:



# Tallinjer, intervall og doble ulikheter

## 1 Tallinjer, intervall og doble ulikheter

- Tallinja
- Doble ulikheter og intervall
- Åpne og lukkede intervall
- Halvåpne intervall og uendelige intervall
- Standard notasjon

## 2 Andregradsulikheter

## 3 Rasjonale ulikheter

# Halvåpne intervall

- Om det ene endepunktet er med, og det andre ikke er med, blander vi vinkelparenteser,  $\langle$ , og firkantparenteser,  $[$ .

# Halvåpne intervall

- Om det ene endepunktet er med, og det andre ikke er med, blander vi vinkelparenteser,  $\langle$ , og firkantparenteser,  $[$ .
- Intervallet som består av alle tall større enn 0 og mindre enn eller lik 3 skrives

$$\langle 0, 3].$$

# Halvåpne intervall

- Om det ene endepunktet er med, og det andre ikke er med, blander vi vinkelparenteser,  $\langle$ , og firkantparenteser,  $[$ .
- Intervallet som består av alle tall større enn 0 og mindre enn eller lik 3 skrives

$$\langle 0, 3 \rangle.$$

- Intervallet som består av alle tall større enn eller lik 0 og mindre enn 3 skrives

$$[0, 3\rangle.$$

# Halvåpne intervall


- Om det ene endepunktet er med, og det andre ikke er med, blander vi vinkelparenteser,  $\langle$ , og firkantparenteser,  $[$ .
- Intervallet som består av alle tall større enn 0 og mindre enn eller lik 3 skrives

$$\langle 0, 3 \rangle.$$

- Intervallet som består av alle tall større enn eller lik 0 og mindre enn 3 skrives

$$[0, 3\rangle.$$

- Vi blander også pilspisser om vi skal tegne det opp på tallinja.



# Uendelige intervall

- Om et intervall går uendelig langt den ene retningen, bruker vi en pil til å representere det.

# Uendelige intervall

- Om et intervall går uendelig langt den ene retningen, bruker vi en pil til å representere det.
- Intervallet som består av alle tall større enn 3 skriver vi som

$$\langle 3, \rightarrow \rangle.$$

# Uendelige intervall

- Om et intervall går uendelig langt den ene retningen, bruker vi en pil til å representere det.
- Intervallet som består av alle tall større enn 3 skriver vi som

$$\langle 3, \rightarrow \rangle.$$

- Intervallet som består av alle tall mindre enn eller lik  $-2$  skriver vi som

$$\langle \leftarrow, -2 \rangle.$$

# Uendelige intervall

- Om et intervall går uendelig langt den ene retningen, bruker vi en pil til å representere det.
- Intervallet som består av alle tall større enn 3 skriver vi som

$$\langle 3, \rightarrow \rangle.$$

- Intervallet som består av alle tall mindre enn eller lik  $-2$  skriver vi som

$$\langle \leftarrow, -2 \rangle.$$

- Vi bruker **aldrig** firkantparenteser ved siden av pilen.

# Uendelige intervall


- Om et intervall går uendelig langt den ene retningen, bruker vi en pil til å representere det.
- Intervallet som består av alle tall større enn 3 skriver vi som

$$\langle 3, \rightarrow \rangle.$$

- Intervallet som består av alle tall mindre enn eller lik  $-2$  skriver vi som

$$\langle \leftarrow, -2 \rangle.$$

- Vi bruker **aldrig** firkantparenteser ved siden av pilen.
- Vi tegner det på tallinjen ved å la intervallet «fortsette» videre:



# Tallinjer, intervall og doble ulikheter

## 1 Tallinjer, intervall og doble ulikheter

- Tallinja
- Doble ulikheter og intervall
- Åpne og lukkede intervall
- Halvåpne intervall og uendelige intervall
- Standard notasjon

## 2 Andregradsulikheter

## 3 Rasjonale ulikheter

# Standard notasjon

- Norsk lærerstab, og derfor også norske videregående-bøker i matematikk, er (såvidt jeg vet) eneste i verden som bruker vinelparenteser for åpne intervall.

# Standard notasjon

- Norsk lærerstab, og derfor også norske videregående-bøker i matematikk, er (såvidt jeg vet) eneste i verden som bruker vinelparenteser for åpne intervall.
- Nesten hele resten av verden bruker runde parenteser.

# Standard notasjon

- Norsk lærerstab, og derfor også norske videregående-bøker i matematikk, er (såvidt jeg vet) eneste i verden som bruker vinelparenteser for åpne intervall.
- Nesten hele resten av verden bruker runde parenteser.
- Der norske lærebøker skriver  $\langle -3, 5 \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(-3, 5)$ .

# Standard notasjon

- Norsk lærerstab, og derfor også norske videregående-bøker i matematikk, er (såvidt jeg vet) eneste i verden som bruker vinelparenteser for åpne intervall.
- Nesten hele resten av verden bruker runde parenteser.
- Der norske lærebøker skriver  $\langle -3, 5 \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(-3, 5)$ .
- Andre mattebøker bruker heller ikke piler til å representere uendelige intervall, men bruker heller  $\pm\infty$ .

# Standard notasjon

- Norsk lærerstab, og derfor også norske videregående-bøker i matematikk, er (såvidt jeg vet) eneste i verden som bruker vinelparenteser for åpne intervall.
- Nesten hele resten av verden bruker runde parenteser.
- Der norske lærebøker skriver  $\langle -3, 5 \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(-3, 5)$ .
- Andre mattebøker bruker heller ikke piler til å representere uendelige intervall, men bruker heller  $\pm\infty$ .
- Der norske lærebøker skriver  $\langle 3, \rightarrow \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(3, \infty)$ .

# Standard notasjon

- Norsk lærerstab, og derfor også norske videregående-bøker i matematikk, er (såvidt jeg vet) eneste i verden som bruker vinelparenteser for åpne intervall.
- Nesten hele resten av verden bruker runde parenteser.
- Der norske lærebøker skriver  $\langle -3, 5 \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(-3, 5)$ .
- Andre mattebøker bruker heller ikke piler til å representere uendelige intervall, men bruker heller  $\pm\infty$ .
- Der norske lærebøker skriver  $\langle 3, \rightarrow \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(3, \infty)$ .
- Der norske lærebøker skriver  $\langle \leftarrow, -1 \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(-\infty, -1)$ .

# Standard notasjon

- Norsk lærerstab, og derfor også norske videregående-bøker i matematikk, er (såvidt jeg vet) eneste i verden som bruker vinelparenteser for åpne intervall.
- Nesten hele resten av verden bruker runde parenteser.
- Der norske lærebøker skriver  $\langle -3, 5 \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(-3, 5)$ .
- Andre mattebøker bruker heller ikke piler til å representer uendelige intervall, men bruker heller  $\pm\infty$ .
- Der norske lærebøker skriver  $\langle 3, \rightarrow \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(3, \infty)$ .
- Der norske lærebøker skriver  $\langle \leftarrow, -1 \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(-\infty, -1)$ .
- Den største fordelen med å bruke runde parenteser over vinkelparenteser er at man ikke har vinkelparenteser på tastaturet.

# Standard notasjon

- Norsk lærerstab, og derfor også norske videregående-bøker i matematikk, er (såvidt jeg vet) eneste i verden som bruker vinelparenteser for åpne intervall.
- Nesten hele resten av verden bruker runde parenteser.
- Der norske lærebøker skriver  $\langle -3, 5 \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(-3, 5)$ .
- Andre mattebøker bruker heller ikke piler til å representera uendelige intervall, men bruker heller  $\pm\infty$ .
- Der norske lærebøker skriver  $\langle 3, \rightarrow \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(3, \infty)$ .
- Der norske lærebøker skriver  $\langle \leftarrow, -1 \rangle$  vil andre mattebøker skrive  $(-\infty, -1)$ .
- Den største fordelen med å bruke runde parenteser over vincelparenteser er at man ikke har vincelparenteser på tastaturet.
- Merk at  $<$  og  $\langle$  er forskjellige, det ene er et ulikhetstegn, det andre er et parentestegn.

**OSLOMET**

**OSLO METROPOLITAN UNIVERSITY  
STORBYUNIVERSITETET**