

OSLOMET

Optimering

Nikolai Bjørnestøl Hansen

OSLO METROPOLITAN UNIVERSITY
STORBYUNIVERSITETET



Foto: Ronny Østnes / OsloMet

1 Tangenter og normaler


2 Optimering

- Maksima og minima
- Optimering

3 Optimering i geometri

Maksima og minima

Topp- og bunnpunkter



- Et **toppunkt** er et punkt hvor funksjonen er **større** enn punktene i nærheten.
- Et **bunnpunkt** er et punkt hvor funksjonen er **mindre** enn punktene i nærheten.
- Et **globalt** topp- eller bunnpunkt er et punkt som er større/mindre enn **alle** andre punkter.
- Her ser vi at det globale toppunktet er i **høyre endepunkt**.
- Og det globale bunnpunktet er i det **stasjonære punktet** i $x = 2$.

Ekstremalpunkt og hvor de er å finne

- Anta en funksjon er **deriverbar** på et **lukket intervall**.
- Da er de to valgene fra forrige side de eneste mulighetene.
- Et ekstremalpunkt vil enten være et stasjonært punkt, eller et endepunkt.
- Om funksjonen ikke er deriverbar i et punkt, må vi også sjekke det punktet.
- Om funksjonen er definert på et **åpent intervall** kan det være den ikke har globale ekstremalpunkt.
- Ekstremalpunktet «burde» vært på kanten, men er ikke en del av definisjonsmengden.
- Dette kan også skje om den er definert på et lukket intervall, men ikke kontinuerlig.

Optimering

Optimering

- Å **optimere** noe betyr å finne ut av når det er **best**.
- Om det vi optimerer beskrives av en funksjon, betyr det da typisk å finne globalt **toppunkt** eller **bunnpunkt**.
- Om en funksjon beskriver hvor mye du kan tjene, vil du finne det globale **toppunktet**.
- Om en funksjon beskriver hvor mye du skal betale, vil du finne det globale **bunnpunktet**.
- Vi kan også være interessert i når funksjonen vokser eller synker **fortest**.
- Da finner vi ekstremalpunkt for den **deriverte**.
- Ekstremalpunktene er da enten i **endepunktene** eller **vendepunktene**.

Optimering, eksempel

Oppgave

Summen av to tall er 200. Hva er det høyeste produktet du kan få?

- Vi gir tallene navn x og y , og har da at $x + y = 200$. Det gir oss $y = 200 - x$.
- Funksjonen vi skal maksimere er $f(x) = x \cdot y = x \cdot (200 - x) = 200x - x^2$.
- Vi finner toppunkt ved å **derivere**, og sette deriverte **lik null**.

$$f'(x) = 0 \iff 200 - 2x = 0 \iff 100 = x.$$

- Det høyeste produktet er derfor når $x = 100$, som gir oss $y = 100$, og $x \cdot y = 10000$.

Optimering, eksempel II

Oppgave

Regnmengden i mm et døgn er gitt ved $r(t) = 0,001t^3 - 0,051t^2 + 0,792t + 2$. Her er t målt i timer, så $t \in [0, 24]$.

- 1 Finn når på døgnet det var **mest** nedbør.
 - 2 Finn når på døgnet det var **minst** nedbør.
 - 3 Finn når på døgnet nedbørsmengden **endret** seg mest.
- Siden vi både skal optimere mengden nedbør og endringen i nedbør, trenger vi både $r'(t)$ og $r''(t)$.
 - Vi begynner utregningen på neste side.

Optimering, eksempel II

- Vi har $r(t) = 0,001t^3 - 0,051t^2 + 0,792t + 2$.
- Vi skal finne ekstremalpunkter, og setter derfor den deriverte lik null.

$$r'(t) = 0 \iff 0,003t^2 - 0,102t + 0,792 = 0 \iff t = 12 \vee t = 22.$$

- Vi må også sjekke om endepunktene kan være rett svar.
- Vi har derfor $t = 0$, $t = 12$, $t = 22$, og $t = 24$ å sjekke.
- Vi setter inn og får

$$\begin{array}{ll} r(0) = 2, & r(22) = 5,388, \\ r(12) = 5,888, & r(24) = 5,456. \end{array}$$

- Det var derfor **mest** nedbør ved $t = 12$ og **minst** nedbør ved $t = 0$.

Optimering, eksempel II

- Vi har $r'(t) = 0,003t^2 - 0,102t + 0,792$.
- Vi skulle også finne når nedbørsmengden **endret** seg mest.
- Vi vil finne ekstremalpunkt til den **deriverte**.
- Vi vil derfor finne når den dobbelderiverte er null, og får

$$r''(t) = 0 \iff 0,006t - 0,102 = 0 \iff t = 17.$$

- Igjen må vi også sjekke **endepunktene**. Vi får

$$\begin{aligned}r'(0) &= 0,792, \\r'(17) &= -0,075, \\r'(24) &= 0,126.\end{aligned}$$

- Den største **endringen** i nedbør er derfor når $t = 0$.

OSLOMET

OSLO METROPOLITAN UNIVERSITY
STORBYUNIVERSITETET